

Klamydia - fakta

(Clamydia tracomatis)

- 20 000 tilfeller i Norge i 2005
- Den vanligste seksuelt overførbare bakterielle infeksjon i Norge
- Vanligst hos seksuelt aktive mellom 16 og 25 år (1 av 10 kan være smittet)
- Smitter ved samleie (kan også overføres ved oralsex)
- 20% smittefare
- Nesten 80% av de smittede kan ha smitten uten å ha symptomer

Symptomer kan være:

- Svie når man tisser
 - Smerter i underlivet hos jenter, i pungen hos gutter
 - Unormale blødninger og utflod hos jenter
 - Svie og utflod fra endetarmsåpning
 - Utflod fra penis
 - Svie/ubehag ved- og/eller etter samleie
-
- Inkubasjonstid: 5-14 dager
 - Klamydiainfeksjon er den vanligste enkeltstående årsak til sterilitet
 - Kondom beskytter ved riktig bruk

Klamydia – testing

- Testing anbefales etter hvert partnerskifte
- Både gutter og jenter må teste seg
- Testing kan gjøres ved urinprøve eller penselprøve
- Man kan teste seg 14 dager etter aktuelt samleie for smitte
- Ved urintest må det være over en time siden man tisset når testen gjennomføres.
- Testsvar foreligger etter ca. en uke
- Behandling er en spesiell antibiotika som foreskrives av lege
- Testing og behandling er gratis
- Du kan enkelt få testet deg på Helsestasjon for ungdom og studenter i Ås